

非淋球菌尿道炎 (NGU)

(又稱非淋球菌尿道炎及非特异性尿道感炎)

非淋球菌尿道炎(NGU)是由例如：衣原體、支原體、ureaplasma或滴蟲等引起的性病。它是在性交、肛交及可能口交的過程中由一個人傳染給另一個人的。

非淋球菌尿道炎是如何傳染擴散的？

引起非淋球菌尿道炎的細菌是在性交、肛交及可能口交過程中由一個人傳染給另一個人的。

我應注意甚麼？

男性：

- ✓ 陰莖頭排出的液體，這種情況可能是很溫和而且沒有治療也會在幾天內消失。
- ✓ 陰莖內疼或癢。
- ✓ 小便時疼或灼熱感。
- ✓ 你有可能在完全沒有症狀下染上非淋球菌尿道炎（百分之五十的男性是沒有症狀的）。

非淋球菌尿道炎嚴重嗎？

有時，非淋球菌尿道炎會引起男性的陰囊炎。對女性來說，則比較嚴重，因為引起非淋球菌尿道炎的細菌能夠引起婦女骨盆炎。骨盆炎會引致不孕（失去生育小孩的能力）、宮外孕及長期性骨盆痛，特別在性交時。

— 請翻看背頁 —

如果患有非淋球菌尿道炎,怎麼辦?

- ✓ 一旦確定你受感染,我們將給你抗菌素。我們將檢查排出物及驗尿。
很重要的是服完給你的藥,才能把細菌完全殺滅。
- ✓ 你的性伴侶必須接受檢查及醫治。如果不醫治,他(他們)會又再傳染給你,或傳染給別人。
- ✓ 在醫治后一周,停止性活動。在你和性伴侶雙方服藥期間停止性活動。
- ✓ 雖然你的衣原體檢查結果是陰性,但不表示你無病。請記住,有幾種原因能引起非淋球菌尿道炎,一些原因我們不做檢查。

如果你從性交或肛交中接觸到非淋球菌尿道炎,又不知道這位性伴侶是否有愛滋病毒的話,你應為自己增加患愛滋病的危險性而擔心。請與你的醫生商談。

警告: 愛滋病也是一種性病。所有性病都是因為不安全性交而傳染擴散的。當你感染到某種性病時,你也可能染到愛滋病。保護自己 — 使用安全套!

若需要檢查性病或治療
請洽你的醫生、本地診所或前來:

市立診所
七街 356 號
(Folsom 福森街 夾 Harrison 哈利遜街)
三藩市 加州 94103