

衣原體 (Chlamydia)

衣原體是一種由某種細菌引起的性病。衣原體能够傳染到男性、女性及小孩。它是在性交、肛交及口交過程中由一個人傳染給另一個人的。

衣原體是如何傳染擴散的？

衣原體是在性交、肛交及口交過程中由一個人傳染給另一個人的。衣原體也可以因觸摸到陰道液體而傳染到眼睛。媽媽染此病的嬰兒，在出生時會得眼睛和肺感染。

我應注意甚麼？

男性：

- ✓ 陰莖頭或肛門排出的液體
- ✓ 陰莖頭疼或癢
- ✓ 小便時疼感

百分之五十(50%)受感染的男性是沒有症狀的

女性：

- ✓ 外陰或陰道疼痛或癢
- ✓ 陰道排出的液體
- ✓ 陰道或肛門有異常的流血
- ✓ 小便時疼感
- ✓ 性交時疼感

百分之八十(80%)受感染的女性是沒有症狀的

在受感染后的三十天內，有可能出現症狀，但隨即會消失。受感染的人仍受感染，而且會把衣原體傳染給其性伴侶。如果你有性活動，請定期見醫生，檢查是否有染到衣原體或其它種類的性病。

衣原體嚴重嗎？

是！如果你是女性而染上衣原體會造成不孕。骨盆炎(PID)，對婦女來說是一種嚴重的病。患骨盆炎是對衣原體感染不醫治的常見結果。衣原體會從陰道、子宮頸移到子宮、輸卵管及卵巢。因為輸卵管阻塞及結疤，會造成輸卵管的損害，使婦女有較大機會得「宮外孕」。

如何醫治衣原體？

- ✓ 你的臨床醫師會給你抗菌素消除你體內的衣原體，但就算在你把藥服完之前你已感覺好轉，也務請要服完所有開出給你的藥。
- ✓ 你的性伴侶必須接受檢查及醫治。如果不醫治，他（他們）會又再傳染給你，或傳染給別人。
- ✓ 在醫治後一周，停止性活動。在你和性伴侶雙方服藥期間停止性活動。

如何避免染上衣原體？

- ✓ 每次性交用安全套
- ✓ 如果你或你的性伴侶有超過一個性伴侶，而你又不是每次都用安全套的話，請考慮接受定期的性病檢查
- ✓ 預早計劃。在性活動之前，跟新的性伴侶談一下衣原體或其它性病及用安全套的必要性。在性活動之前提議一下，為你和你的新伴侶進行性病檢查。

如果你從性交或肛交中接觸到衣原體，又不知道這位性伴侶是否有愛滋病毒的話，你應為自己增加患愛滋病的危險性而擔心。請與你的醫生商談。

苦需要檢查性病或治療
請洽你的醫生、本地診所或前來：

市立診所
七街 356 號
(Folsom 福森街 夾 Harrison 哈利遜街)
三藩市 加州 94103