

对淋病患者伴侣的治疗 (Cefixime 800mg)

请仔细阅读以下内容

我为什么需要服用此药？

你的性伴侣最近接受了淋病(Gonorrhea)的治疗。你可以通过与已经患有淋病的人发生性关系而被感染，这种感染是可以治愈的。许多已感染淋病的人并不知道自己有这个病，因为他们感觉良好，并且没有任何症状。但是，如果你不吃药治好它，你可能会病的很重。

你可能患有淋病，因此接受治疗很重要。我们希望确保你尽快得到所需的药物。治疗淋病的最佳方法是注射一针抗生素加上服用一粒抗生素，你只能在城市诊所(City Clinic)或医生诊所接受此抗生素注射。如果你在一周内不能去城市诊所(City Clinic)或你的医生诊所，则你应该服用随附的药物。

此药安全吗？

此药很安全。但是，如果你有下列任何问题，则应咨询你的医生或到城市诊所(City Clinic)就诊。如果有以下情况，请不要服用此药：

- 你是女性，并且有下腹疼痛、性交疼痛、呕吐或发烧。
- 你是男性，并且有睾丸(球)疼痛或肿胀，或者发烧。
- 你曾经对强力霉素(Doxycycline)或其他四环素(tetracycline)抗生素都有过不良反应、皮疹或过敏。
- 你曾经对头孢克肟(Cefixime, Suprax)、头孢泊肟(Cefpodoxime, Vantin)或任何头孢菌素(cephalosporin, 任何以 cef-或 ceph-开头的抗生素)都有过不良反应、皮疹或过敏，或者对青霉素(Penicillin)有过危及生命的反应。
- 你长期患有严重的疾病，如肾病、心脏病或肝病。

我该如何服用此药？

- 你将收到 2 粒白色 400mg 头孢克肟(Cefixime)。
- **立即用水服用此头孢克肟(Cefixime)。**
- 此药可能引起胃部不适、腹泻、恶心或呕吐，但这些症状不会持续很长时间。如果这些症状持续存在或者出现皮疹或发烧，请联系你的医生或城市诊所(City Clinic)。
- 服用此药期间，避免长时间太阳直射。
- 不要将此药分享或给其他任何人。
- 服用头孢克肟(Cefixime)后的 7 天内不要发生性行为，因为此药物治疗淋病需要 7 天时间。如果你在服用此药后的 7 天内发生了无保护的性行为，则你仍然可以将该感染传染给你的性伴侣。
- 我们建议你在 3 个月后重新测试，以确保你没有再次感染。

如果我还有问题怎么办？

如果你对此药有任何疑问，请在门诊时间致电(415) 487-5595。所有电话都是保密的。你也可以到城市诊所(City Clinic)就诊，包括：检查、测试和药物。有关更多信息和方向，请访问我们的网站。

City Clinic
356 7th Street
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500
www.sfcityclinic.org

星期一	上午 8 点至下午 4 点
星期二	下午 1 点至下午 6 点
星期三	上午 8 点至下午 4 点
星期四	下午 1 点至下午 4 点
星期五	上午 8 点至下午 4 点

