

Indicaciones para el Tratamiento de Parejas Sexuales con Tricomonas (Metronidazole 2 gms)

POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE

Porque es necesario que yo tome esta medicina?

Recientemente su pareja sexual ha recibido tratamiento para *Tricomonas*. *Tricomonas* es una infección que es curable pero que se puede adquirir cuando se tiene relaciones sexuales con alguien que ya la tiene. Muchas personas con *Tricomonas* no saben que tienen la infección porque aparentemente se sienten bien y no tienen síntomas. Sin embargo, si usted no se toma la medicina para curarse, se puede poner muy enfermo/a.

Usted podría tener *Tricomonas*. Es importante que reciba tratamiento. Nosotros queremos estar seguros que usted reciba la medicina lo mas pronto posible. La mejor manera de cuidarse es de ver a un doctor o venir a City Clinic para un chequeo y medicina. Si usted no puede ir con su doctor o venir a City Clinic dentro de una semana, debería de tomarse la medicina que esta incluida con este folleto.

Es esta medicina segura?

Esta medicina es muy segura. Sin embargo, debería de hablar con su doctor o venir a City Clinic si tiene unos de los problemas que se encuentra en la siguiente lista. **NO TOME la medicina si:**

- Usted es una mujer que esta o piensa que podría estar embarazada
- Usted es una mujer y tiene dolor de estomago, dolor al tener relaciones sexuales, vomito o fiebre
- Usted es un hombre y tiene dolor o inflamacion en los testiculos o fiebre
- Usted ha tenido una reaccion, sarpullido o alergia a Metronidazole o Flagyl
- Usted tiene una enfermedad seria como de los riñones, corazon e higado

Como deberia de tomarme la medicina?

- Usted recibira 4 pastillas blancas de 500mg de Metronidazole
- Tome las 4 pastillas a la misma vez con un vaso lleno de agua
- Esta medicina puede causarle un malestar de estomago, diarrea, nausea, vomito, o cambio de color en el orin. Esto no deberia de durar mucho tiempo. Pero, si estos sintomas continuan o desarrolla un sarpullido o fiebre, llame a su doctor o a City Clinic
- No tome alcohol durante las primeras 24-horas de tomar esta medicina. Le podria causar mal efecto.
- No comparta, ni le de esta medicina a nadie mas
- No debe de tener relaciones sexuales por los proximos 7 dias porque durara 7 dias para que la medicina combate la infeccion. Si tiene relaciones sexuales sin proteccion durante los 7 dias despues de tomar la medicina, podria infectar a su(s) pareja(s)
- Recomendamos que se vuelva a examiner en 3 meses para que este seguro/a de no estar infectado/a otravez

Que puedo hacer si todavia tengo preguntas?

Si tiene preguntas sobre esta medicina, por favor llame al (415) 487-5595 durante las horas de clinica. Todas las llamadas son confidenciales. Tambien puede venir a City Clinic para una visita de bajo costo o gratis que incluye: examen, prueba y medicina. Para mas informacion y direcciones, visite nuestra pagina de internet.

City Clinic	Lunes	8 am – 4pm
356 7 th Street	Martes	1 pm – 6 pm
San Francisco, CA 94103	Miercoles	8 am – 4 pm
(415) 487-5500	Jueves	1 pm – 4 pm
www.sfcityclinic.org	Viernes	8 am – 4 pm



A landmark in prevention