

Clamidia

(Chlamydia)

Clamidia es una enfermedad transmitida sexualmente (ETS) causada por un tipo de bacteria. Clamidia puede infectar a hombres, mujeres y menores de edad. Se pasa de una persona a otra durante sexo vaginal, anal y oral.

¿Cómo se transmite clamidia?

Clamidia se pasa durante sexo vaginal, anal y oral. También se puede pasar a los ojos si se tocan los flujos de la vagina o pene y después se tocan los ojos. Los bebés pueden ser infectados durante el parto, causando infecciones en los ojos y los pulmones.

¿Cuáles son los síntomas?

Hombres:

- Secrecion o flujo del peno o ano
- Dolor o comezon en la cabeza del pene
- Dolor al orinar

50% de los hombres infectados no tienen síntomas

Mujeres:

- Dolor y comezon en la vulva o la vagina.
- Secrecion o flujo vagina
- Sangrando anormal en la vagina o ano
- Dolor al orinar
- Dolor al tener sexo

80% de las mujeres infectadas no tienen síntomas

Los síntomas pueden aparecer entre los primeros 30 días de infección y después desaparecer. La persona infectada sigue infectada y puede infectar a su pareja sexual con clamidia. Si usted es sexualmente activo visite a su doctor para que le hagan prueba de clamidia y otras enfermedades transmitidas sexualmente.

¿Es serio la clamidia?

¡Sí! Si usted es mujer y tiene clamidia le pueden causar infertilidad. La enfermedad inflamación pélvica (PID) es una infección peligrosa en las mujeres y es el resultado de no recibir tratamiento para clamidia. Durante (PID) la bacteria se mueve de la vagina hacia el cerviz y adentro del útero, las trompas y los ovarios. Bloqueo y cicatriz puede dañar las trompas y hacer que una mujer tenga un embarazo tubal.

¿Cómo se cura la clamidia?

- Su doctor le va dar antibióticos para curar la clamidia. Tómese toda la dosis que le den aun si se siente mejor antes de terminarlas.
- Su pareja debe de ser examinado y recibir tratamiento. Si no recibe tratamiento puede infectarse de nuevo o infectar a otras personas.
- Si recibe tratamiento no tenga relaciones por una semana. No tenga relaciones con su pareja mientras estan ellos tomando la medicina.

¿Cómo puedo evitar la clamidia?

- Planea y Protejase
- Si usted va a tener sexo con una pareja nueva:
- Hable de enfermedades transmitidas sexualmente
- Hable sobre su deseo de usar condones 100% del tiempo

Para mas informacion sobre ETSs, consulte estas paginas de internet:

<http://www.noah-health.org/>

<http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/>

<http://www.ashastd.org/>

<http://www.sfsi.org/>

<http://www.cdc.gov/std/>

Si usted a contraído clamidia de sexo anal debe de hablar con su doctor sobre el riesgo de contraer VIH.

Para exámenes o tratamiento de ETSs
visita a tu médico, clínica local, o ven a:

City Clinic
356 Calle Séptima
(entre Folsom y Harrison)
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500

<http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/>



A landmark in prevention

Revised 12/29/04