

滴蟲病 (Trichomonas)

滴蟲病是一種由原蟲引起的性病。滴蟲病能夠傳染到男性和女性，但較多症狀在女性身上。它是在性交過程中由一個人傳染給另一個人的。

滴蟲病是如何傳染擴散的？

滴蟲病是在性交過程中由一個人傳染給另一個人的。我們不認為滴蟲病能從口交或肛交中傳染。目前沒有好的檢查方法在喉部或肛門部，檢查滴蟲病。

我怎樣知道如果患上滴蟲病？

女性：

- ✓ 一種黃綠或灰的泡沫狀液體從陰道排出，並可能帶有難聞氣中。
- ✓ 陰道或陰道周圍癢或灼熱感。
- ✓ 小便時疼感。

男性：

- ✓ 通常男性沒有任何迹像或不適，因此受感染也不知道。檢查男性是否有滴蟲病並不是一個好方法。
- ✓ 陰莖有可能不舒服或癢。
- ✓ 極少會在小便時疼或灼熱感。

— 請翻看背頁 —

如何避免染上滴蟲病?

- ✓ 每次性交用安全套
- ✓ 確定你的男伴接受醫治以免再受感染。
- ✓ 在性活動之前，談一下性病問題。在性活動之前計劃一下為你和你的新伴侶進行性病檢查。

怎麼辦，如果染上滴蟲病?

- ✓ 你的臨床醫師會給你「滅滴靈」醫治滴蟲病。
- ✓ 如果你懷孕，請告訴你的醫生。
- ✓ 在服食滅滴靈之前24小時和之后一天不要飲任何酒類。否則會引起不適。
- ✓ 如果性交，請用安全套。在完成治療后，停止性交一周

如果你接觸到滴蟲病，又不知道這位性伴侶是否有愛滋病毒的話，你應為自己增加患愛滋病的危險性而擔心。請與你的醫生商談。

警告：愛滋病也是一種性病。所有性病都是因為不安全性交而傳染擴散的。當你感染到某種性病時，你也可能染到愛滋病。保護自己 — 使用安全套!

若需要檢查性病或治療
請洽你的醫生、本地診所或前來

市立診所
七街 356 號
(Folsom 福森街 夾 Harrison 哈利遜街)
三藩市 加州 94103