

## 对淋病和衣原体性病患者伴侣的治疗 (Azithromycin 1 gm 和 Cefixime 800mg)

请仔细阅读以下内容

### 我为什么需要服用此药？

你的性伴侣最近接受了淋病(Gonorrhea)和衣原体性病(Chlamydia)的治疗。你可以通过与已经患有该疾病的人发生性关系而被感染，这些感染是可以治愈的。许多已感染这些疾病的人并不知道自己有这些病，因为他们感觉良好，并且没有任何症状。但是，如果你不吃药治好它，你可能会病的很重。

你可能患有淋病和/或衣原体性病，因此接受治疗很重要。我们希望确保你尽快得到所需的药物。治疗衣原体性病和淋病的最佳方法是服用一粒抗生素药加上注射一针抗生素，你只能在城市诊所(City Clinic)或医生诊所接受此抗生素注射。如果你在一周内不能去城市诊所(City Clinic)或你的医生诊所，则你应该服用随附的药物。

### 此药安全吗？

此药很安全。但是，如果你有下列任何问题，则应咨询你的医生或到城市诊所(City Clinic)就诊。如果有以下情况，请不要服用此药：

- 你是女性，并且有下腹疼痛、性交疼痛、呕吐或发烧。
- 你是男性，并且有睾丸(球)疼痛或肿胀，或者发烧。
- 你曾经对阿奇霉素(Azithromycin, Zithromax)、红霉素(Erythromycin)或克拉霉素(Clarithromycin, Biaxin) 都有过不良反应、皮疹或过敏。
- 你曾经对头孢克肟(Cefixime, Suprax)、头孢泊肟(Cefpodoxime, Vantin)或任何头孢菌素(cephalosporin, 任何以 cef-或 ceph-开头的抗生素)都有过不良反应、皮疹或过敏，或者对青霉素(Penicillin)有过危及生命的反应。
- 你长期患有严重的疾病，如肾病、心脏病或肝病。
- 你正在服用处方药，特别针对心脏病或严重心理疾病。

### 我该如何服用此药？

- 你将收到 2 粒粉色或蓝色 500mg 阿奇霉素(Azithromycin)(用于衣原体性病和淋病)和 2 粒白色 400mg 头孢克肟(Cefixime)(用于淋病)。
- 将此阿奇霉素(Azithromycin)和头孢克肟(Cefixime)药物一起与食物和满杯水同服。
- 此药可能引起胃部不适、腹泻、恶心或呕吐，但这些症状不会持续很长时间。如果这些症状持续存在或者出现皮疹或发烧，请联系你的医生或城市诊所(City Clinic)。
- 不要将此药分享或给其他任何人。
- 在接下来的 7 天内不要发生性行为，因为此药物治疗这些感染需要 7 天时间。如果你在服用此药后的 7 天内发生了无保护的性行为，则你仍然可以将这些感染传染给你的性伴侣。
- 我们建议你在 3 个月后再重新测试，以确保你没有再次感染。

### 如果我还有问题怎么办？

如果你对此药有任何疑问，请在门诊时间致电(415) 487-5595。所有电话都是保密的。你也可以到城市诊所(City Clinic)就诊，包括：检查、测试和药物。有关更多信息和方向，请访问我们的网站。

City Clinic  
356 7<sup>th</sup> Street  
San Francisco, CA 94103  
(415) 487-5500  
[www.sfcityclinic.org](http://www.sfcityclinic.org)

星期一	上午 8 点至下午 4 点
星期二	下午 1 点至下午 6 点
星期三	上午 8 点至下午 4 点
星期四	下午 1 点至下午 4 点
星期五	上午 8 点至下午 4 点

