

受毛滴蟲 (Trichomoniasis) 患者感染的伴侶治療 (甲硝唑 Metronidazole 2 克)

請仔細閱讀此內容

我為何需要服用這種藥？

您的性伴侶最近接受了毛滴蟲感染的治療。毛滴蟲感染是可以治癒的傳染病，會經由與該病患者發生性關係而得。毛滴蟲感染患者不知道自己已被感染，因為他們感覺健康且沒有任何症狀。但是，如果您不服藥可能會演變成重病。

您可能患有毛滴蟲感染。接受治療非常重要。我們希望確保您盡快獲得所需的藥物。照顧自己的最好方法是至您的醫師處看診，或到市診所 (City Clinic) 進行檢查和服藥。如果您在 1 週內無法到您的醫師處或市診所就診，您應該服用隨附的藥物。

這種藥物安全嗎？

這種藥物很安全。但是，如果您出現以下任何症狀，則應與您的醫生聯絡或前往市診所。**如果出現以下情況，請「不要」服用藥物：**

- 您知道自己已懷孕，認為自己可能已懷孕或打算懷孕
- 您是女性，且下腹部有疼痛感、性行為時疼痛、嘔吐或發燒
- 您是男性，且睪丸（蛋蛋）感覺疼痛或腫脹或您有發燒
- 您曾經對多甲硝唑 (Metronidazole) 或咪唑尼達 (Flagyl) 有不良反應、皮膚疹或過敏
- 您患有嚴重的長期疾病，例如腎臟、心臟或肝臟疾病

我該如何服用此藥物？

- 您會收到 4 顆 500 毫克的白色甲硝唑藥丸。
- 以一整杯水同時服用 4 顆藥丸。
- 此藥可能引起胃部不適、腹瀉、噁心、嘔吐或者尿色加深。這不會持續很長時間。如果這些症狀持續或您出現皮疹或發燒症狀，請與您的醫生或市診所聯絡。
- 在服用此藥物後的 24 小時內，請勿飲用任何有酒精的飲料。這可能會讓您感到非常不舒服。
- 請勿與他人分享或向他人提供此藥。
- 接下來的 7 天不要有性行為，因為該藥需要 7 天才能治癒毛滴蟲感染。如果您在服藥後 7 天內進行無保護的性行為，仍可能將疾病傳染給您的性伴侶。
- 我們建議您在 3 個月後重新檢查，以確保您沒有再次被感染。

如果我仍然有疑問該怎麼辦？

如果您對藥物有任何疑問，請在診所服務時間內致電 (415) 487-5595。所有來電皆保密。您還可以到市診所就診，包括：檢查、測試和藥物。請瀏覽我們的網站 www.sfcityclinic.org 以了解詳情和使用說明。

市診所
356 7th Street
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500
www.sfcityclinic.org

星期一
星期二
星期三
星期四
星期五

上午 8 時至下午 4 時
下午 1 時至 6 時
上午 8 時至下午 4 時
下午 1 時至 4 時
上午 8 時至下午 4 時

