

患者提供的伴侣滴虫病治疗药物
(甲硝唑 500mg, 每日两次, 连用 7
天) 伴侣在出生时被认定为女性

请非常仔细地阅读本文件

为什么我需要服用该药物?

你的性伙伴最近接受过滴虫病治疗。滴虫病是一种可治愈的传染病, 你可能会因为与已经患有本病的人有过性接触而招致感染。许多患有滴虫病的人并不知道患有本病, 因为他们感觉良好, 且没有任何症状。不过, 如果你没有服用药物来治愈本病, 那你的疾病就会变得非常严重。

你可能患有滴虫病。你有必要接受治疗。我们希望确保你尽快获得所需的药物。照顾好你自己的最佳方法是去看医生或前往 **City Clinic** (城市诊所) 去接受检查并获取药物。如果你在 1 周内不能去看医生或前往 **City Clinic** 就诊, 你应当服用随附的药物。

该药物安全吗?

该药物非常安全。不过, 如果你有以下列出的任何问题, 你应当告知你的医生或前往城市诊所就诊。**如果你有**
下列情况, 请勿服用该药物:

- 你知道你已经怀孕, 认为你可能已经怀孕, 或计划怀孕
- 你是女性, 并有下腹疼痛、性交疼痛、呕吐或发热症状
- 你曾经因为服用甲硝唑 (Flagyl) 而出现过不良反应、皮疹或过敏反应
- 你患有某种严重的慢性疾病, 如肾脏、心脏或肝脏疾病等

我如何服用该药物?

- 你将接受 14 片 500mg 甲硝唑药片。
- 每次一片、一日两次, 连续服用七天。用满满一杯水进行冲服。
- 该药物可能会导致你出现胃部不适、腹泻、恶心、呕吐或小便颜色加深。但这不应持续很长时间。如果这些症状持续或你出现了皮疹或发热, 请联系你的医生或 **City Clinic**。
- 服用该药物以后, 24 小时内不得饮酒。这可能会使你出现严重疾病。
- 请勿将该药物与其他任何人分享或提供给其他任何人。
- 在接下来的 7 天内, 请禁绝性生活, 因为该药物需要 7 天时间才能治愈滴虫病。如果你在服用该药物以后 7 天内有未加保护的性生活, 你仍然可能会将疾病传播给您的性伴侣。
- 我们建议在 3 个月内进行复查, 以确保你没有被二次感染。

如果我还有问题, 该怎么办?

如果你对该药物有任何问题, 请在诊所上班时间拨打电话: **628-217 6600**。所有电话内容都将保密。你还可以前往 **City Clinic** 就诊, 包括、检查、检验和取药。更多信息和说明, 请访问我们的网站: **www.sfcityclinic.org**。

City Clinic	周一	上午 8 点 - 下午 4 点
356 7 th Street	周二	下午 1 点 - 下午 6 点
San Francisco, CA 94103	周三	上午 8 点 - 下午 4 点
628-217-6600	周四 上午 8 点 - 11 点	下午 1 点 - 下午 4 点
www.sfcityclinic.org	周五	上午 8 点 - 下午 4 点