

附睪炎

附睪炎是睪丸周圍的管道或有時是睪丸本身的發炎和疼痛。它通常由衣原體和淋病等性傳播細菌引起，但並非總是如此。

附睪炎是如何傳播的？

引起附睪炎的細菌可以在陰道性交、肛交和口交過程中在人與人之間傳播。

我要注意什麼？

睪丸（蛋蛋）或陰囊（球囊）疼痛、腫脹或發紅發熱。排尿時或陰莖有分泌物時也可能會出現疼痛。

附睪炎是否是一種嚴重的感染？

是的，這是一種嚴重的感染。感染可以從陰囊擴散到身體的其他部位，可能引起持續疼痛並導致不孕（精子受阻）。附睪炎可能會導致疼痛，即使在治癒後疼痛也會持續。

如果我患有附睪炎會怎樣？

- 醫師會給您開抗生素藥物。我們將檢查您的尿液中是否含有淋病、衣原體和生殖支原體。務必要完成藥物治療，以徹底殺滅細菌。
- 您的性伴侶必須接受治療。如果他們不接受治療，他們可能會將病毒傳染給您或其他人。
- 完成藥物治療前不要發生性行為。當你們都在服藥時，不要與伴侶發生性行為。
- 您可以透過洗熱水浴、服用布洛芬和穿著有較強支撐力的內褲來治療附睪炎引起的疼痛。
- 即使您的衣原體、淋病或支原體檢測呈陰性，也並不代表您沒有受到感染。請記住，附睪炎有多種不同的病因，其中一些我們無法檢測。
- 3 天後返回就診，以便我們確保您的病情有所好轉。如果您的疼痛加劇、發燒或感到不適，請前往急診室就診。

如何避免患上附睪炎？

- 未雨綢繆！保護好自己！
- 如果想要與新伴侶發生性關係：
 - 先討論 STI 相關事宜。
 - 避孕套可有效降低感染風險。
 - 如果您或您的性伴侶出現 STI（性傳播感染）症狀，請不要發生性行為。

如果您因肛交而感染附睪炎，而您又不知道該性伴侶是否感染了 HIV，您應該接受 HIV 檢測。向您的臨床醫師諮詢如何保護自己免受 HIV 和其他 STI 的感染。

如需了解更多資訊：

請諮詢您的 City Clinic 臨床醫師或您自己的醫療照護提供者。以下網站也提供了有用的資訊：

一般 STI

www.ashasexualhealth.org（也提供西班牙語版本）

www.cdc.gov/std/

www.sfcityclinic.org

www.sfsi.org/

避孕和 STI/性訊息

www.bedsider.org

青少年

www.iwannaknow.org

www.kidshealth.org/teen（也提供西班牙語版本）

www.scarleteen.com

如需進行性傳播感染 (STI) 檢查或治療，
請諮詢您的醫療照護提供者、當地診所，或前往：



City Clinic
356 7th Street
(Folsom 與 Harrison 之間)
San Francisco, CA 94103
(628) 217-6600