

黏液膿性宮頸炎 (MPC)

MPC 是一種子宮頸感染或發炎，可能是也可能不是由性傳播感染 (STI) 引起。

導致 MPC 的病因是什麼？

- 如果您的臨床醫師診斷出 MPC，您將接受衣原體、滴蟲、支原體和淋病檢測。MPC 也可能是由其他微生物引起，您的臨床醫師可能會對這些微生物進行治療。
- 有些確診 MPC 的患者實際上並沒有感染，但表現出可能看起來像是感染的體徵和/或症狀。

MPC 有哪些症狀？

有些患者可能會發現陰道分泌物異常、月經間期出血或性交後出血。

如何治療 MPC？

- 在您的檢測結果出來之前，您的臨床醫師可能會為您提供衣原體和/或淋病的治療。
- 您的性伴侶應接受 STI 檢查，也可能需要治療。

MPC 是否是一種嚴重的疾病？

如果是由淋病、衣原體或支原體引起，則是一種嚴重的疾病。這些感染可能會導致盆腔炎 (PID)，這是一種嚴重的感染，會損傷輸卵管，使患者更有可能發生「輸卵管妊娠」（子宮外妊娠），這種妊娠可能是致命的。PID 甚至可能永久地影響患者的懷孕能力。

如何避免感染 MPC？

- 避孕套可有效降低感染風險。
- 若您或您的性伴侶出現 STI 症狀，包括分泌物、排尿燒灼感、皮疹或生殖器潰瘍，請不要發生性行為。

如需進行性傳播感染 (STI) 檢查或治療，
請諮詢您的醫療照護提供者、當地診所，或前往：



City Clinic
356 7th Street
(Folsom 與 Harrison 之間)
San Francisco, CA 94103
(628) 217-6600
www.sfcityclinic.org

如需了解更多資訊：

請諮詢您的 City Clinic 臨床醫師或您自己的醫療照護提供者。以下網站也提供了有用的資訊：

一般 STI

www.ashasexualhealth.org (也提供西班牙語版本)

www.cdc.gov/std/

www.kidshealth.org/teen (也提供西班牙語版本)

www.sfsi.org/

青少年

www.iwannaknow.org

www.sfcityclinc.org

www.scarleteen.com

避孕和 STI/性資訊

www.bedsider.org

如需進行性傳播感染 (STI) 檢查或治療，
請諮詢您的醫療照護提供者、當地診所，或前往：



A landmark in prevention

City Clinic
356 Seventh Street
(Folsom 與 Harrison 之間)
San Francisco, CA 94103
(628) 217-6600
sfcityclinic.org