

# ПРОКТИТ

Проктит - это инфекция или воспаление прямой кишки. Он может быть вызван бактериями или вирусами.

## **Что вызывает проктит?**

Проктит вызывается гонореей, хламидиями, Мрох, герпесом и другими возбудителями, передающимися при анальном сексе.

## **На что следует обратить внимание?**

Боль в прямой кишке, кровотечение, язвы и/или выделения - все это возможные симптомы проктита. Также возможен опухший и болезненный лимфатический узел в паху.

## **Опасен ли проктит?**

Да, заболевание может быть опасно. Проктит бывает очень болезненным и повышает риск заражения ВИЧ, гепатитом С и другими инфекциями, передающимися половым путем. Невылеченный проктит приводит к образованию рубцов и другим тяжелым/болезненным долгосрочным последствиям.

В некоторых случаях проктит вызывается LGV (lymphogranuloma venereum). LGV - это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП) и вызываемая определенными штаммами хламидий.

## **Что будет, если у меня обнаружили проктит?**

- Вам назначат антибиотические препараты. *Важно пройти полный курс медикаментозного лечения, чтобы полностью уничтожить инфекцию.*
- Если у вас обнаружен проктит, необходимо сдать анализ на LGV. Лабораторный анализ на LGV проводится только в том случае, если ректальный анализ на хламидии окажется положительным. В зависимости от результатов анализов мы можем перезвонить вам и попросить принимать антибиотики более длительным курсом.
- Ваши половые партнеры должны пройти курс лечения. В противном случае они могут передавать инфекцию вам или заразить других.
- Не занимайтесь сексом, пока не закончите прием антибиотика. Не занимайтесь сексом с партнером, пока каждый из вас проходит лечение.
- Если симптомы не проходят, обратитесь в клинику для повторного обследования.

## **Как избежать заражения проктитом?**

Если вы собираетесь заняться сексом с новым партнером:

- Использование презервативов эффективно снижает риск заражения.
- Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом о докси-PEP.
- Не занимайтесь сексом, если у вас или у вашего сексуального партнера есть симптомы ИППП, включая выделения, жжение при мочеиспускании, сыпь или язвы на половых органах.
- При проктите повышается риск заражения ВИЧ. *Если вы заразились проктитом и при этом ВИЧ-отрицательны, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом по поводу доконтактной профилактики PrEP.*

**Для получения дополнительной информации:**

Проконсультируйтесь с врачом клиники City Clinic или своим лечащим врачом. Также полезную информацию можно найти на следующих сайтах:

**Общие сведения об ИППП**

[www.ashasexualhealth.org](http://www.ashasexualhealth.org) (также на испанском языке)

[www.cdc.gov/std/](http://www.cdc.gov/std/)

[www.sfcityclinic.org](http://www.sfcityclinic.org)

[www.sfsi.org/](http://www.sfsi.org/)

**Контрацепция и информация об ИППП/сексе**

[www.bedsider.org](http://www.bedsider.org)

**Подростки**

[www.iwannaknow.org](http://www.iwannaknow.org)

[www.kidshealth.org/teen](http://www.kidshealth.org/teen) (также на испанском языке)

[www.scarleteen.com](http://www.scarleteen.com)

Чтобы пройти обследование на ИППП или лечение,  
обратитесь к своему лечащему врачу, в местную клинику или приходите в:



City Clinic  
356 7-я улица  
(между Folsom и Harrison)  
Сан-Франциско, Калифорния, 94103  
(628) 217-6600