

Terapia para parejas de pacientes con tricomoniasis (Metronidazol 2 gramos)

POR FAVOR, LEA ESTO ATENTAMENTE

¿Por qué debo tomar esta medicina?

Su pareja sexual recibió hace poco tratamiento contra la tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección curable que se puede contraer por mantener relaciones sexuales con una persona infectada. Muchas personas están infectadas con tricomoniasis sin saberlo porque se sienten bien y no tienen síntomas. Sin embargo, si no toma una medicina para curarse, el cuadro se puede agravar.

Usted podría tener tricomoniasis. Es importante tratarse. Queremos asegurarnos de que usted reciba la medicina que necesita lo antes posible. La mejor forma de cuidarse es visitar a su médico o venir a City Clinic para que le examinen y le receten medicina. Si no puede ir a su médico ni venir a City Clinic en una semana, tome la medicina que incluimos.

¿La medicina es segura?

La medicina es muy segura. Sin embargo, debe hablar con su proveedor o venir a City Clinic si surge alguno de estos problemas. **NO tome la medicina si:**

- Sabe que está embarazada, piensa que podría estar embarazada o planea quedarse embarazada.
- Usted es mujer y siente dolor en el bajo vientre, tiene relaciones sexuales dolorosas, o tiene vómitos o fiebre.
- Es hombre y sufre dolor o hinchazón de los testículos, o tiene fiebre.
- Alguna vez tuvo una reacción adversa, sarpullido o alergia al metronidazol (Flagyl).
- Sufre una afección prolongada grave como enfermedad del riñón, del corazón o del hígado.

¿Cómo tomo la medicina?

- Recibirá 4 píldoras de metronidazol 500 mg.
- Tome las 4 píldoras juntas con un vaso entero de agua.
- Esta medicina puede causar malestar estomacal, diarrea, náuseas o vómitos, u oscurecer su orina. Esto no debería prolongarse mucho. Si los síntomas persisten o si aparece sarpullido o fiebre, póngase en contacto con su proveedor o con City Clinic.
- No beba alcohol las 24 horas después de tomar esta medicina. Podría hacerle sentirse muy enfermo.
- No regale ni comparta esta medicina con nadie.
- No mantenga relaciones sexuales los siguientes 7 días porque la medicina demora 7 días en curar la tricomoniasis. Si usted mantiene relaciones sexuales sin protección durante 7 días después de tomar la medicina, es posible que contagie a sus compañeros sexuales.
- Le recomendamos que vuelva a hacerse pruebas en 3 meses para asegurarse de que no volvió a infectarse.

¿Qué puedo hacer si tengo alguna pregunta?

Si tiene alguna pregunta sobre la medicina, llame al (628) 217-6600 en el horario de atención de la clínica. Todas las llamadas son confidenciales. También puede venir a City Clinic para que lo examinen, le hagan pruebas y le receten la medicina necesaria. Si necesita más información e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.sfcityclinic.org.

City Clinic	Lunes	8 am – 4 pm
356 7 th Street	Martes	1 pm – 6 pm
San Francisco, CA 94103	Miércoles	8 am – 4 pm
(628) 217-6600	Jueves 8-11am	1 pm – 4 pm
www.sfcityclinic.org	Viernes	8 am – 4 pm

