

骨盆檢查和柏氏抹片檢查 (The Pelvic Exam and Pap Smear)

骨盆檢查是一種對陰道（內陰和外陰）、子宮頸（子宮口處）、輸卵管及子宮的檢查。在檢查時，醫師會用窺器（一種幫助醫師查看陰道內部的塑料儀器）檢查陰道。

在檢查過程中會進行多項檢驗：

柏氏抹片：從子宮頸口處輕輕地刮取一些松散細胞。這種檢驗找尋需要治療的早期變化，以防止癌細胞的進一步發展。

濕標本：取陰道分泌液幾滴，在顯微鏡下查看可能的感染（酵母菌、滴蟲、陰道病菌等）。

性病檢查：你的醫師可能會進行淋病和衣原體的檢驗。這些檢驗的方式是驗尿或用綿簽觸碰子宮頸口處。

評估：對生殖疣、包疹、梅毒及其他感染，將由你的醫師進行。你的醫師會小心檢查你的陰道內外。如果你有「痛」，會可能進行其他附加的檢驗。

檢查的第二部分：醫師把窺器取出。他（她）然後將兩手指放入你陰道，同時用另一只手壓你的下腹，試圖感覺你的子宮、輸卵管及卵巢。這種檢查能用作評估懷孕、內部感染及卵巢囊腫等。兩部分的檢查都不痛。

柏氏抹片檢查的進一步細節：

- * 婦女一旦有過性交，她應每年一次進行柏氏抹片檢查，連同其他性病檢查。
- * 婦女在年齡14 - 40歲間，其子宮頸的細胞進入正常的變化期。有時這些細胞變化不正常，那就由柏氏抹片檢查而發現。那些異常變化通常是由疣病毒引起。大多數有兩位以上性伴侶的婦女，已經感染到疣病毒，但只有少數婦女會有這些異常的變化。

- * 如果檢查出你有變化，你會信件通知回到診所進行重復檢查。許多變化會回復正常而不需要任何治療。如果變化較嚴重和（或）持續性的，我們則要用陰道窺器檢查（放大鏡）子宮頸。
- * 進行柏氏抹片檢查的最佳時間是在月經前或月經后。爲了最佳結果，在做完檢查后24小時，不要沖洗、不要在陰道塗藥或暫停性交。
- * 柏氏抹片檢查不同於骨盆檢查，也不是在每次骨盆檢查時進行。
- * 我們建議每位有性活動的婦女，每年做一次檢查，通常包括乳房檢查、簡短的身體檢查、性病檢查及柏氏抹片檢查。
- * 欲知詳情有關生殖疣病毒者，請閱讀我們有關生殖疣的資料單張。

請注意：把你將進行的檢查告訴你的醫生，是很重要的。決定進行某種檢查，是根據你的醫療性史及你的危險性。在每次身體檢查完成時，請問清楚你究竟做了什麼檢查。

警告：愛滋病也是一種性病。所有性病都是因爲不安全性交而傳染擴散的。當你感染到某種性病時，你也可能染到愛滋病。保護自己 — 使用安全套！

若需要檢查性病或治療
請洽你的醫生、本地診所或前來：

市立診所
七街 356 號
(Folsom 福森街 夾 Harrison 哈利遜街)
三藩市 加州 94103