

Indicaciones para el Tratamiento de Parejas Sexuales con Gonorrea y Clamidia (Azithromycin 1gm y Cefixime 800mg)

POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE

Porque es necesario que yo tome esta medicina?

Recientemente su pareja sexual ha recibido tratamiento para *Gonorrea y Clamidia*. Estas son infecciones curables que se puede adquirir cuando se tiene relaciones sexuales con alguien que ya las tiene. Muchas personas con estas infecciones no saben que las tienen porque aparentemente se sienten bien y no tienen síntomas. Sin embargo, si usted no se toma la medicina para curarse, se puede poner muy enfermo/a.

Usted podría tener *Gonorrea y/o Clamidia*. Es importante que reciba tratamiento. Nosotros queremos estar seguros que usted reciba la medicina lo más pronto posible. **El mejor tratamiento para Clamidia y Gonorrea es una pastilla y inyección de antibiótico. Solamente puede recibir la inyección en City Clinic o en la oficina de su doctor.** Si usted no puede ir con su doctor o venir a City Clinic dentro de una semana, debería de tomarse la medicina que está incluida con este folleto.

Es esta medicina segura?

Esta medicina es muy segura. Sin embargo, debería de hablar con su doctor o venir a City Clinic si tiene unos de los problemas que se encuentra en la siguiente lista. **NO TOME la medicina si:**

- Usted es una mujer y tiene dolor de estomago, dolor al tener relaciones sexuales, vomito o fiebre
- Usted es un hombre y tiene dolor o inflamación en los testículos o fiebre
- Usted ha tenido una reacción, sarpullido o alergia a Azithromycin (Zithromax), Erythromycin, o Clarithromycin (Biaxin)
- Usted ha tenido una reacción, sarpullido o alergia a Cefixime (Suprax), Cepodoxime (Vantin), a cualquier Cephalosporin (antibióticos que comienzan con cef- o ceph-), o una reacción a Penicilina
- Usted tiene una enfermedad seria como de los riñones, corazón e hígado
- Usted esta tomando medicina del corazón o para una enfermedad mental

Como debería de tomarme la medicina?

- Usted recibirá 2 pastillas rosadas o azules de 500 mg Azithromycin (para Clamidia) y dos pastillas blancas de 400mg de Cefixime (para Gonorrea)
- Tome las pastillas de Azithromycin y de Cefixime a la misma vez con comida y con un vaso lleno de agua
- Esta medicina puede causarle un malestar de estomago, diarrea, nausea, o vomito. Esto no debería de durar mucho tiempo. Pero, si estos síntomas continúan o desarrolla un sarpullido o fiebre, llame a su doctor o a City Clinic
- No comparta, ni le de esta medicina a nadie mas
- No debe de tener relaciones sexuales por los próximos 7 días porque durara 7 días para que la medicina combata la infección. Si tiene relaciones sexuales sin protección durante los 7 días después de tomar la medicina, podría infectar a su(s) pareja(s)
- Recomendamos que se vuelva a examinar en 3 meses para que este seguro/a de no estar infectado/a otra vez

Que puedo hacer si todavía tengo preguntas?

Si tiene preguntas sobre esta medicina, por favor llame al (415) 487-5595 durante las horas de clínica. Todas las llamadas son confidenciales. También puede venir a City Clinic para una visita que incluye: examen, prueba y medicina. Para más información y direcciones, visite nuestra página de internet.

City Clinic
356 7th Street
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500
www.sfcityclinic.org

Lunes	8 am – 4pm
Martes	1 pm – 6 pm
Miércoles	8 am – 4 pm
Jueves	1 pm – 4 pm
Viernes	8 am – 4 pm

